

APFELSORTENBESCHREIBUNG

beschrieben


durch:

Sorte:

Standort:

Adresse
Koordinaten

Verwechslersorten:

Entstehung	klassische Sorte	neuere Sorte (nach 1950 im Angebot)			
Haltbarkeit	Sommer	Herbst	Winter	Lagersorte	
Fruchtgröße	klein	mittel	groß		
Symmetrie	 gleichhälftig	 ungleichhälftig			
Fruchtbreite/höhe	 platt	 breit	 abgestumpft	 rund	 hochgeb.
Fruchtform	walzenförmig	kegelförmig	eiförmig	glockenförmig	
Bauchigkeit	 stielbauchig	 mittelbauchig	 kelchbauchig		
Querschnitt	 zentriert	 unregelmäßig	 oval		
Rippen / Kanten	schwach	mittel	stark	ohne	
Druckfestigkeit	1 (James Grieve)	2 (Kaiser Wilhelm)	3 (Bohn)		
Oberfläche	glatt	rau			
Wachs	trocken	geschmeidig	fettig		
Berostung	flächig	netzförmig	Rostfiguren	ohne	
Rostfarbe	grau	braun			
Fruchtreief	Narben	Warzen			
Schale – Geruch	schwach	mittel	kräftig	ohne	
Lentizellen-Form	rund	eckig	Sternchen		
Lentizellen-Kontrast	hell	dunkel	hell auf dunkel	dunkel auf hell	
Lentiz.-Abweichungen	erhaben	eingesunken		unterschichtig	
Lentizellen-Hof	weiß	rot	grün	ohne	
Grundfarbe	weiß	grün	gelb	gelbgrün	
Deckfarbe	Backe	großflächig	ganzflächig	ohne	
Streifen	schwach	intensiv	a.d.g. Frucht	ohne	
Deckfarbe-Ton	orange (Blenheim)	hellrot (Nordhausen)	dunkelrot (Th. Rambur)		
Deckfarbe-Struktur	verwaschen		marmoriert		
Reif, Dunst	abwischbar		nicht abwischbar	ohne	
Stielgrube-Tiefe	flach	mittel	tief		
Stielgrube-Weite	eng	mittel	weit		
Stielgrube-Höcker	schwach	mittel	stark	ohne	
Stielgrube-Rost	flächig	strahlig	netzförmig	ohne	
Stielgr.-Rost-Auspräg.	fein	schuppig	narbig	kreisförmig	
Stiel-Länge	kurz	mittel	lang		
Stiel-Ausprägung	dünn	dick	knopfig	knospig	Fleischansatz